

在来種（草本類・木本類） 植生用種子

種類	品種名	適応			用途									生育特性							
		寒地	温暖地	暖地	一般草丈 m	形態等	播種適期 月	耐暑性	耐寒性	耐旱性	耐陰性	耐煙性	耐瘦性	耐湿性	耐潮性	耐酸性	種子1g中の 平均粒数	標準			
																		純度%	発芽率%	発芽温度 ℃	
草本類	キク科	ヨモギ	◎	◎	◎	0.5~1.5		3~7	△	○	○	○	△	○	○	○	○	3,000	60	60	20~30
	イネ科	カヤ（ススキ）	○	◎	◎	1.0~2.0		3~6	◎	△	◎	△	○	◎	△	○	◎	2,000	80	30	20
	タデ科	イタドリ	◎	◎	○	0.5~1.5		3~6	○	◎	○	○	◎	○	△		◎	800	80	50	20~30
	マメ科	メドハギ	○	◎	◎	0.5~1.0	肥料木草	3~6	○	△	◎	△	○	◎	△	○	○	600	98	70	20~30
		ヤハズソウ	○	◎	◎	0.1~0.3	肥料木草	3~6	○	△	◎	△	○	◎	△	○	○	350	90	60	20~30
木本類	マメ科	ヤマハギ（皮付き）	○	◎	◎	1.0~2.0	落葉広葉、肥料木	3~6	○	△	◎	△	△	◎	△		△	130	98	60	20~30
		ヤマハギ（皮取り）	○	◎	◎	1.0~2.0	落葉広葉、肥料木	3~6	○	△	◎	△	△	◎	△		△	180	98	80	20~30
		コマツナギ	△	◎	◎	0.2~3.0	落葉広葉、肥料木	3~6	○	△	◎	△	○	◎	△	○	△	210	98	60	20~30
		イタチハギ	○	◎	◎	2.0~4.0	落葉広葉、肥料木	3~7	○	△	◎	○	◎	◎	○	◎	△	100	98	55	20~30
		エニシダ	△	◎	◎	1.0~3.0	落葉広葉、肥料木	4~6	○	○	○	○	△	○	○	○	△	100	95	55	20~30
	カバノキ科	ヤシャブシ	○	◎	◎	2.0~7.0	落葉広葉、肥料木	3~6	○	○	◎	△	○	◎	△	△	○	900	80	60	20~30
		ヤマハンノキ	○	○	△	5.0~15.0	落葉広葉、肥料木	3~6	△	○	○	△	△	◎	○	△	○	1,000	55	30	20~30
		シラカンバ	◎	△		20.0~25.0	落葉広葉、先駆樹種	3~6		○	△	△	△	○	◎		○	4,200	50	20	20~30
	バラ科	シャリンバイ		○	◎	1.0~4.0	常緑広葉	12~6	◎	△	○	◎	◎	○	○	◎	○	4	99	50	20~30
	モクセイ科	ネズミモチ		○	◎	2.0~5.0	常緑広葉	12~6	◎	△	○	○	◎	△	△	◎	◎	20	99	50	20~30
	マツ科	クロマツ	△	◎	○	25.0~30.0	常緑針葉、先駆樹種	3~6	◎	○	◎		○	◎	△	◎	◎	80	90	70	20~30
		アカマツ	△	◎	○	25.0~30.0	常緑針葉、先駆樹種	3~7	◎	○	◎		△	◎		△	○	100	90	70	20~30

◎ 最適または最強 ○ 適または強 △ やや適またはやや弱 無印 不適または弱 ※標準発芽日数は最適条件下での値